



**Kronborg Vestre Birks Biavlerforening**  
*Biavl mellem Kattegat og Gribskov*

**Skolebigård:**  
Mårumvej 59  
3230 Græsted

**Hjemmeside:**  
[www.kvbb-biavl.dk](http://www.kvbb-biavl.dk)

**Formand:**  
Mette Simonsen  
Bomskolevej 9  
3220 Tisvildeleje  
Tlf.: 30 11 47 74  
**E-mail:**  
formanden@kvbb-biavl.dk

## Ugebrev uge 26 – 2017. Onsdag 28. juni.

### Hvad er vigtigt i dag?

Indsamling og tælling af varroamider fra alle opstablingsstederne.

Fraskæring af dronetavle og den sædvanlige sikring af at der er en dronning i familien.

**Nr. 4:** To småfamilier. Har de plads nok? Skal der evt. bygges i højden?

**Nr. 9:** Den selvavede dronning lægger to æg i cellerne, bierne er sure...

Er der noget fornuftig yngel i familien eller er det droner og ingenting? Tegn på dronningeceller?

Evt. afliver vi hende og i næste uge tilsætter en ny dronning fra dronningekurset i 'kravlegård'.

Hvad kan man ellers hvis man ikke lige har en dronning i baglommen?

**Småfamilier.** Vi regner med at tilsætte nogle af vores kursusdronninger.... Så vi vælger model 2.

**Nr 11 og nr 10 eller 14** skal levere yngeltavler. Noter på studekortet hvilken familie der er ophav.

I stedet for at lave en dobbeltfamilie laver vi to enkeltfamilier. En i nr. 13 og en på nr. 16.

### Produktion af småfamilier (se også [biavl.dk](http://biavl.dk) for info og video)

I juli er der oftest et overskud af yngeltavler og man kan fint fjerne yngeltavler fra produktionsfamilierne og lave småfamilier helt uden omkostninger for bifamilierne. Tidspunktet for produktion af småfamilierne kan være lige fra starten af juni, hvor man har de første ubefrugtede dronninger, til helt hen i august måned.

En ny bifamilie skal have tilført unge bier, pollen og foder så den kan klare sig den første tid uden at være afhængig af at skulle samle noget ind i naturen. Småfamilierne har så at sige ingen trækbier.

Omkring den 1. juli vil en opskrift for en 5 rammers småfamilie være som nedenfor. Hvis man fodrer med det samme (og det gør vi) erstattes fodertavlen og kunsttavler af yngeltavler med påsiddende bier. (**Dvs. 1 pollentavle, 3 yngeltavler. Vigtigt at der er æg/spæd yngel hvis bierne selv skal lave dronning, 1 jomfrutavle, husk foder**) Så kan det vurderes om der evt. skal lidt løse bier (E) til eller om familien forstærkes hurtigt nok af de tre yngeltavler.

1) Familie der selv skal lave dronning	2) Familie hvor dronning tilsættes (ugen efter)
A. En god pollentavle med påsiddende bier. B. En god yngeltavle med æg og spæd yngel. C. En kunsttavle, evt. en jomfrutavle D. En god fodertavle, gerne med uforseglet honning og pollen. E. Ca. 1,5 liter unge bier (=bier fra 2-3 yngeltavler).  Tavlerne skal være med påsiddende bier.  Ægtavlen skal helst komme fra en god familie, så man ikke avler videre på sværmlystne eller	A. En god pollentavle med påsiddende bier. B. En god yngeltavle med forseglede yngel, der skal til at krybe. C. En kunsttavle, evt. en jomfrutavle (parret dronning). D. En god fodertavle, gerne med uforseglet honning og pollen. E. Ca. 1,5 liter unge bier (=bier fra 2-3 yngeltavler).  Tavlerne skal være med påsiddende bier.

aggressive bier. (Vælger vi en model 1 skal vi bruge ægtavle fra nr. 11)	Tilsættes en parret dronning er det vigtigt at det er en jomfrutavle der tilsættes, således at hun straks kan gå i gang med at lægge æg. Tilsættes en jomfrudronning, tilsættes en kunstavle.
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flyvesprækken indsnævres til 5 cm, da de nye bifamilier ikke har vagtbier og derfor kan blive udsat for røveri. Brug evt. græs til at lukke flyvesprækken. Det visner og falder selv ud efter et par dage.

**Tilsætning af dronning** (en parret dronning er mest sikkert) ugen efter.

Normalt bør man kunne tilsætte dronningen direkte i et indføringsbur, dog vil bierne have en tendens til ikke at ville acceptere en uparret dronning. Derfor skal direkte tilsætning gøres med forsigtighed. Livrem og sele metoden er at lade aflæggeren stå i 5-6 dage, hvorefter man fjerner alle dronningeceller i aflæggeren. Når al yngel i den nye familie er forsegleet risikerer man ikke at bierne fristes til at lave deres egen dronning og i stedet dræber den man møjsommeligt har fået lavet/anskaffet dyrt. Herefter skulle tilsætningen af den nye dronning være helt sikker.

### **Drivfodring er vigtigt!**

Er der ikke indbæring af nektar skal de nye familier drivfodres. Der skal hele tiden være en foderbræmme omkring yngellejet, men yngellejet må ikke fyldes med foder, så hindres dronningen i æglægning. Bemærk, at når der kryber hele yngeltavler i bifamilien, øges antallet af bier voldsomt. Det kan derfor være nødvendigt at tilsætte yderligere rammer.

Som nævnt ovenfor fodrer vi bifamilierne med det samme, med små portioner apifonda.

**I næste uge** (5. juli) laver vi vinterleje. Dvs. at vi gør nederste kasse klar til at være overvintringskasse og samler rammerne i trugstaderne forrest i trugstadet. Så kan øvrige kasser/rammer nemt fjernes til august og pakkes til omsmelting. De rammer der overvintres på skal være fra i år. Der må ikke overvintres på de samme rammer to år i træk. Det giver øget risiko for sygdom i familierne.

Husk at ugebrevene lægge på hjemmesiden under 'Skolebigården' → Ugebreve

### **Stadevægte ([www.stadevægt.dk](http://www.stadevægt.dk)) (Uge 25: 19. – 25. juni)**

Hørsholm -0.1, -0.4, -0.2, -0.1, 0.1, -0.2, -0.4, i alt -1.3 kg

Lyngby 0.9, -0.6, -0.8, -0.1, 0.3, -0.4, -0.7, i alt -1.5 kg